

ร่าง- ปฏิทินการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ ใช้ระหว่างรอความชัดเจน/หนังสือราชการแจ้งฯ ปฏิทินฯ 62 จากกองควบคุมโรคด้วยวัคซีนฯ
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้อีก ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| รอบปี | เครือข่ายส่งใบเบิก วัคซีนให้ สสอ. | สสอ.ส่งใบเบิก ให้คลังวัคซีน | เครือข่ายรับวัคซีน ที่คลังวัคซีน | วันให้บริการ วัคซีน | คลังวัคซีน key- Onhand | หมายเหตุ |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|---------------------------|--|
| 1/2562 | 1-5 ต.ค 61 | 8-12 ต.ค 61 | 15-16 ต.ค 61 | 17-19 ต.ค 61 | 24 -25 ต.ค 61 | |
| 2/2562 | 29 ต.ค-2 พ.ย 61 | 5-9 พ.ย.61 | 12-13 พ.ย 61 | 14-16 พ.ย 61 | 19-20 พ.ย 61 | |
| 3/2562 | 26 พ.ย- 30 พ.ย.61 | 3-7 ธ.ค 61 | 11 ธ.ค 61 | 12-14 ธ.ค 61 | 17-18 ธ.ค 61 | |
| 4/2562 | 1-4 ม.ค 62 | 7-11 ม.ค 62 | 14-15 ม.ค.62 | 16-18 ม.ค 62 | 21-22 ม.ค 62 | |
| 5/2562 | 28 ม.ค-1 ก.พ 62 | 4-8 ก.พ 62 | 11-12 ก.พ 62 | 13-15 ก.พ 62 | 18-19 ก.พ 62 | |
| 6/2562 | 25ก.พ-1 มี.ค 62 | 4-8 มี.ค 62 | 11-12 มี.ค 62 | 13-15 มี.ค 62 | 18-19 มี.ค 62 | |
| 7/2562 | 1-5 เม.ย 62 | 8-10 เม.ย62 | 16 เม.ย 62 | 17-19 เม.ย 62 | 22-23 เม.ย 62 | |
| 8/2562 | 1-3 พ.ค.62 | 6-10 พ.ค 62 | 13-14 พ.ค 62 | 15-17 พ.ค 62 | 20-21 พ.ค 62 | ให้วัคซีนเด็ก 0-5 ปีและ สำรวจ -นร.ป.1 สอบ ประวัติ MMR , HB, BCG, dT, OPV/ IPV,LAJEที่ ได้รับไม่ครบ -นร.ป.5 หญิง รับ HPV |
| 9/2562 | 27-31 พ.ค 62 | 3-7 มิ.ย 62 | 10-11 มิ.ย 62 | 12- 14 มิ.ย 62 | 17 -18 มิ.ย 62 | Onhand วัคซีน dT ป.6 |
| นักเรียน 1/2562 | 27-31 พ.ค 62 | 3-7 มิ.ย 62 | <u>นักเรียน ป.1</u> ให้วัคซีน BCG ,HB,dT ,OPV, MR,IPV, LAJE ตามประวัติได้รับวัคซีนไม่ครบ ภายในมิ.ย.—ก.ค | | | |
| 10/2562 | 1-5 ก.ค 62 | 8-12 ก.ค 62 | 15-16 ก.ค.62 | 17-19 ก.ค. 62 | 22-23 ก.ค. 62 | |
| นักเรียน 2/2562 | 1-5 ก.ค 62 | 8-12 ก.ค 62 | <u>นักเรียนหญิง ป.5</u> ให้วัคซีน HPV เข็ม 1 เดือน ก.ค 62 <u>นักเรียน ป.6</u> ได้รับ dT ทุกคนภายใน ก.ค-ส.ค 62 | | | **HPV เข็ม 2 กระตุ้น เดือน ม.ค – กพ. 63 |
| 11/2562 | 29 ก.ค-2 ส.ค 62 | 5 -9 ส.ค 62 | 13 ส.ค 62 | 14-16 ส.ค 62 | 19-20 ส.ค 62 | |
| 12/2562 | 26-30 ส.ค 62 | 2-6 ก.ย.62 | 9-10 ก.ย. 62 | 11-13 ก.ย. 62 | 16-17 ก.ย. 62 | |

เป้าหมาย

- เร่งรัดวัคซีนให้มีความครอบคลุมวัคซีนแต่ละชนิดของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ,ยกเว้นวัคซีน MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เป็นรายพื้นที่ (หมู่บ้าน/ตำบล/เทศบาล) วัคซีนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เป็นรายโรงเรียน
 - เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ให้วัคซีน BCG,HB ชนิดเดียว 1 ครั้งแรกตลอด, OPV 3 ครั้ง,เพิ่ม IPV แก่เด็กอายุ 4 เดือนทุกราย, DTP-HB 3 ครั้ง, MMR 1 1 ครั้ง
 - เด็กอายุ 1ปี ให้วัคซีน LAJE 1 ครั้ง (Live Attenuated JE Vaccine) 1 ครั้ง
 - เด็กอายุ 1 ปีครึ่ง -2 ปี ให้วัคซีน DTP 1 ครั้ง, OPV 1 ครั้ง(ครั้งที่ 4)
 - เด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง ให้วัคซีน MMR2 กระตุ้น 1 ครั้ง ,วัคซีน LAJE 2 กระตุ้น 1 ครั้ง
 - เด็กอายุ 4-5 ปี ให้วัคซีน DTP 1 ครั้ง OPV 1 ครั้ง (ครั้งที่ 5)
 - หญิงมีครรภ์ให้วัคซีน dT ครบชุด หรือ ตามประวัติการได้รับวัคซีนและอยู่ในระยะคุ้มครอง
 - นักเรียน ป.1 ให้วัคซีน BCG เฉพาะเด็กที่ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีรอยแผลเป็นปรากฏ HB , MR , dT, OPV ,IPV , LAJE เฉพาะรายได้รับไม่ครบ
 - นักเรียน ป.6 ให้วัคซีน dT 1 ครั้ง ทุกราย,
 - นักเรียนหญิง ป.5 ทุกคนที่มีสัญชาติไทย(และไม่ใช่ไทย) ให้วัคซีน HPV 2 เข็มห่างกัน 6 เดือน

**วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้ว แต่ได้รับไม่ครบตามกำหนดนัด สามารถให้วัคซีนต่อได้ทันทีเมื่อพบ โดยไม่ต้องเริ่มตั้งต้นฉีดใหม่

การให้วัคซีน dT ในหญิงตั้งครรภ์

ให้สอบถามประวัติการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของเชื้อบาดทะยัก (DTP-HB,DTP,dT,TT)ในอดีตแล้วให้วัคซีนดังนี้

| ประวัติการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของเชื้อบาดทะยัก (DTP-HB,DTP,dT,TT) | จำนวนเข็มและระยะห่างในการให้วัคซีน |
|---|---|
| ยังไม่เคยได้รับวัคซีน | ให้ฉีด 3 เข็ม โดยเริ่มให้เข็มแรกทันทีที่มาฝากครรภ์ เข็ม 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน เข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 6 เดือน จากนั้นกระตุ้นอีก 1 เข็ม ทุก 10 ปี |
| เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม ไม่ว่าจะนานเท่าใด | ให้ฉีดอีก 2 เข็ม โดยให้เข็ม 2 (เข็มแรกในครั้งนี้) ทันทีที่มาฝากครรภ์ ห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 1 เดือน เข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 6 เดือน จากนั้นกระตุ้น 1 เข็ม ทุก 10 ปี |
| เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ไม่ว่าจะนานเท่าใด | ให้ฉีดเพิ่มอีก 1 เข็ม ทันทีที่มาฝากครรภ์ โดยเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 6 เดือน จากนั้นกระตุ้นอีก 1 เข็ม ทุก 10 ปี |
| เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม และเข็มสุดท้ายนานกว่า 10 ปี | ให้ฉีดทันทีที่มาฝากครรภ์ 1 เข็ม จากนั้นให้กระตุ้นอีก 1 เข็มทุก 10 ปี |
| เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม และเข็มสุดท้ายน้อยกว่า 10 ปี | ไม่ต้องฉีดในระหว่างตั้งครรภ์ ครั้งนี้ แต่ให้กระตุ้นอีก 1 เข็มทุก 10 ปี |
| เคยได้รับวัคซีน DTP ครบ 5 เข็ม และ dT เมื่อเรียนอยู่ชั้น ป. 6 นานกว่า 10 ปี | ให้ฉีดทันทีที่มาฝากครรภ์ 1 เข็ม จากนั้นให้กระตุ้นอีก 1 เข็มทุก 10 ปี |

ในกรณีไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีนในอดีต ให้ฉีด dT 3 เข็ม โดยให้เข็มแรกเมื่อมาฝากครรภ์ เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มสอง อย่างน้อย 6 เดือน ถ้าภายหลังฉีดแล้วประมาณ 4 - 12 ชั่วโมง เกิดปฏิกิริยา ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีดและโดยรอบมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติ โดยอาการบวมอาจลามไปถึงข้อศอก ซึ่งเป็นปฏิกิริยาแสดงว่าเคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของบาดทะยักมาแล้วและมีระดับภูมิคุ้มกันสูง ร่างกายจึงเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า Arthus reaction ให้หยุดฉีด dT อย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ต้องวินิจฉัยแยกโรคจากการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (cellulitis) เนื่องจากการฉีดที่ไม่สะอาดและมีการปนเปื้อน ซึ่งมักเจ็บมากเวลาจับต้อง อาจมีไข้ร่วมด้วย ถ้าเป็นปฏิกิริยา Arthus reaction จะหายได้เองภายในเวลา 2 - 3 วัน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 7 วัน