

<b>วิธีการปฏิบัติการงานทีมควบคุมโรค DHF DF DSS</b>
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม : งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ

### ความหมายไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก (Dengue Fever) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue) ที่แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการป่วยรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคเป็นยุงที่ออกหากินเฉพาะในตอนกลางวัน ชอบอาศัยอยู่ในแถบอากาศร้อนชื้น จึงพบได้มากในประเทศเขตร้อนในทวีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกากลางและใต้ ตอนเหนือของออสเตรเลีย และตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก จากการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ไข้เลือดออกจึงเป็นหนึ่งในโรคที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความสนใจ และประกาศให้เป็นโรคที่ควรเฝ้าระวัง

### วิธีปฏิบัติในการดำเนินงาน

#### ๑. ภาวะปกติ

- ทีม SRRT สรุปสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสนับสนุนงบประมาณ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ โดยเน้นเริ่มต้นเดือนมีนาคม , เมษายน ของทุกปี

#### ๒. ภาวะฉุกเฉิน

- เมื่อมีผู้ป่วย DHF , DF , DSS หรือ R/O DHF , R/O DF , R/O DSS ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอภูเพียง ดำเนินการแจ้งผู้ป่วยยัง รพ.สต.ทันทีเมื่อรับทราบข้อมูล รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- รพ.สต.ดำเนินการแจ้ง อบต. ในพื้นที่เพื่อประสานการดำเนินงานควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง
- ประชุมทีม SRRT เตรียมความพร้อมและออกสอบสวนโรค รักษา และค้นหาผู้ป่วยใหม่
- ทีม SRRT รายงานผลเบื้องต้นให้สาธารณสุขอำเภอ/นายอำเภอทราบ
- รพ.สต. เฝ้าระวังการเกิดโรคในพื้นที่ ๒๘ วันนับจากผู้ป่วยรายสุดท้าย

# แนวทางปฏิบัติงานกับควบคุมโรค อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (DHF, DF, DSS)

## ภาวะปกติ

คุณสุวิทย์ ไชยวิโน 083-202-0996  
054-797-101  
Line กลุ่มระบาดวิทยาเชียงกลาง

## ภาวะฉุกเฉิน

ในเวลาราชการแจ้ง 054-797-111  
, 054-797-101, 083-202-0996  
นอกเวลาราชการแจ้ง 083-202-0996, Line  
กลุ่มระบาดวิทยาอุ้มเพียง

ผู้ป่วย DHF , DF ,  
DSS หรือ R/O DHF  
R/O DF , R/O DSS

ทีม SRRT. สรุป  
สถานการณ์ วิเคราะห์  
แนวโน้มการเกิดโรค

ศูนย์ระบาดวิทยา  
อำเภอเชียงกลาง

ศูนย์  
ระบาด  
วิทยา  
จังหวัด

รพ.น่าน  
/เชียงกลาง

รพ./รพ.สต. แจ้ง  
เดือนประชาชน

อบต.

แจ้ง  
รพ.สต.พื้นที่

ทีม SRRT  
(เตรียมอุปกรณ์  
,เอกสาร)

อบต.

-อบต. พ่นสารเคมีทำลายตัว  
แก่ทันที (รัศมีไม่น้อยกว่า 100  
ม.) ด้วยสเปรย์กระพือง  
-พ่นสารเคมี วันที่ 1 - 3 - 7  
หลังจากพบผู้ป่วย

### เริ่มต้นเดือน มีนาคม,เมษายน

- สำรวจความชุกของ  
ลูกน้ำยุงลาย
- ประเมินค่า BI , CI  
ทุกเดือน
- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์  
ลูกน้ำยุงลาย

สนับสนุน  
งบประมาณ/  
เครื่องมือ/สารเคมี

ประชุมเตรียมความรู้ทางวิชาการ  
แบ่งหน้าที่ (1/2 ชั่วโมง)

-ผู้นำประชาสัมพันธ์เสี่ยงตาม  
สาย ( การป้องกันโรค, ค้นหา  
ผู้ป่วยใหม่ )  
-รณรงค์สำรวจ/ทำลายแหล่ง  
เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  
-ประเมินค่า BI , CI รัศมี  
100 เมตร

SRRTออกสอบสวนโรค ให้การรักษา ค้นหา  
ผู้ป่วยใหม่ / อบต.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง

สรุปผล  
การสอบสวนโรคเบื้องต้น

ทีม SRRT. รายงานผลเบื้องต้น  
ให้ สสอ./นายอำเภอ ทราบ

รพ.สต./ สสข.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่  
28 วันนับจากผู้ป่วยรายสุดท้าย

รายงานผลให้  
จังหวัดทราบภายใน  
24 ชั่วโมง

ทีม SRRT. สนับสนุน/  
ติดตาม

ไข้เด็งกี  
Dengue fever



<p><b>เกณฑ์ทางคลินิก</b> มีไข้แบบเฉียบพลัน ร่วมกับมีอาการอื่น อย่างน้อย 2 ใน 7 คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปวดศีรษะอย่างรุนแรง</li> <li>- ปวดกระบอกตา</li> <li>- ปวดกล้ามเนื้อ</li> <li>- ปวดกระดูกและข้อต่อ</li> <li>- มีผื่น</li> <li>- มีอาการเลือดออก</li> <li>- Tourniquet test ให้ผลบวก</li> </ul>	<p><b>เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ</b> ทั่วไป ( 1 อย่าง ) มีเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 5,000 เซลล์/ลบ.มม.</p>
---	--

ไข้เลือดออก  
Dengue hemorrhagic fever



<p><b>เกณฑ์ทางคลินิก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีไข้แบบเฉียบพลันและสูงลอย</li> <li>- มีอาการเลือดออก</li> <li>- Tourniquet test ให้ผลบวก</li> <li>- ตับโตมักกดเจ็บ</li> <li>- มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบไหลเวียนโลหิต</li> </ul>	<p><b>เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ</b> ทั่วไป ( อย่างน้อย 2 อย่าง )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100,000 เซลล์/ลบ.มม.</li> <li>- มีฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากเดิมหรือ</li> <li>- มี pleural effusion</li> </ul>
--	---

ไข้เด็งกี  
Dengue shock syndrome fever



<p><b>เกณฑ์ทางคลินิก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีไข้แบบเฉียบพลันและสูงลอย</li> <li>- มีอาการเลือดออก</li> <li>- Tourniquet test ให้ผลบวก</li> <li>- ตับโตมักกดเจ็บ</li> <li>- มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบไหลเวียนโลหิต</li> </ul>	<p><b>เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ</b> ทั่วไป ( อย่างน้อย 2 อย่าง )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100,000 เซลล์/ลบ.มม.</li> <li>- มีฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากเดิมหรือ</li> <li>- มี pleural effusion</li> </ul>	<p>มีภาวะความดันโลหิต ลดต่ำลง ( Shock )</p>
--	---	---